

AUJESZKY: pautes vacunació i serologia. (febrer 2010)

VACUNACIONS : Programa mínim

Engreix TD-TF	1ª oliosa	2ª oliosa	3ª oli/aigua	4ª
	10-12 set vida	als 21-28d	als 6m vida	
Engreix EE i CT	1ª oliosa	2ª oliosa	oli/aigua	oli/aigua
	10-12 set vida	als 21-28d	als 21-28d	als 6m vida
Reproductores	3 olioses/any, de forma simultània i a intervals regulars. 4 olioses/any als municipis pendents de qualificar (Juneda, Puig-Gros, Arbeca, Vilasana)			
Recria	3 olioses: 10-12 setm, 13-16 setm, 21-24 setm vida			
SEROLOGIA: Programa mínim				
Reproductores	Mínim 2 controls/any (semestrals, amb interval < 7 mesos). Expl Grup Especial: controls quadrimestrals. Rc amb EE: 95/5 cada 4 m			
Reposició	Autoreposició: 100% de cada lot que entri. Rep externa: 20% de cada lot que entri amb document de trasllat (i certificat d'autocontrols en els 15 d previs). Si hi ha resultats desfav o no porta autocontrol s'ha de sagnar 100%			
Engreix	TD/TF: 16 mostres 15 dies abans d'anar a escorxador (Vet Resp supervisat ADS/GSP) EE i Eng continu: 16 m per nau amb porcs amb permanència > 14 setm (Vet Resp supervisat ADS/GSP). Ctrl quadrimestral. Engr dels CT: amb els sanejaments semestrals d'ADS/GSP			
Isowean's	TD/TF: 16 mostres per nau amb garrins > 18 Kg. Controls semestrals. EE i Eng continus: 16 mostres per nau amb garrins > 18 Kg. Controls bimensuals			

Desapareix la Zona de baix risc de reinfecció (Noguera Alta, Alt Urgell, Solsones, Segarra)

Desapareix la Zona de risc de reinfecció però queden 4 municipis pendents de QS: **Juneda, Arbeca, Puig-Gros i Vilasana**

El programa aplicable al territori es únic: el que s'indica a dalt, i només varia que als municipis pendents de QS s'han d'aplicar mínim 4 vacunes olioses a les reproductores enlloc de 3.

S'han tret les serologies addicionals als garrins que venen de l'antiga zona de risc.

Per tal de mantenir nivells de seguretat **s'avancen els sanejaments** dels 4 municipis pendents de QS (realitzar abans del 30-03-10, preferentment 15-03-10)

A més es faran **controls serològics de les partides de garrins provinents de fora de Catalunya**. Les **OOCC** han de comunicar per e-mail al Centre de dades d'Aujeszky i al coordinador de malalties del porcí les autoritzacions d'entrades de garrins de fora de Catalunya (Autoritz entrada garrins fora Cat.xls)

També es varia el procediment a seguir en cas d'aparició d'un single reactor (+/D) d'Aujeszky: fins ara s'identificava l'animal i es feia una 95/5 als 30 dies del sacrifici. Com que a la demarcació de Lleida interessa saber immediatament que està passant es permetrà, motivadament i amb comunicació a l'Equip de Malalties de Porcí, treure mostres de les truges de l'entorn per veure si hi ha hagut circulació del virus (La +/D s'ha de sacrificar).

Per Aujeszky ja **es pot retornar TDS** a totes les explotacions que no tinguin alguna restricció específica.

Es manté el **control de gB** a les explotacions i l'aplicació de les corresponents mesures en funció dels resultats.



El Responsable de Malalties del Porcí del DAR atenent que la malaltia d'Aujeszky està tenint una evolució favorable i l'opinió dels Veterinaris Responsables, de comú acord amb el Servei de Sanitat Animal ha establert les següents modificacions corresponents de les pautes de vacunació i serologia mínimes a aplicar.

Tota Lleida queda equiparada com a Zona Normal:

- S'elimina la Zona de risc de reinfecció i resta com a Zona Normal ja que els controls efectuats han obtingut resultats negatius, i per tant ja no resulten pertinents les serologies addicionals als garrins que provenien d'aquesta zona. Resten, però, 4 municipis pendent de qualificar (Vilassana, Puiggròs, Juneda i Arbeca) on s'avançarà el sanejament i el programa vacunal a les reproductores serà 4 vacunes olioses/any en lloc de 3.
- S'elimina la Zona de baix risc de reinfecció (Noguera alta, Alt Urgell, Segarra, Solsonès) i també resta com a Zona Normal.

Cal insistir molt al sector que encara no es pot reduir la pressió de vacunació sota cap concepte i que hem de continuar treballant amb insistència en aquest aspecte. El programa vacunal es de mínims i s'ha de complir meticulosament. S'ampliaran els controls de gB i s'aplicaran mesures en cas de resultats desfavorables. Si es procedent es passarà informació a tots els actors del sector dels incompliments en la pauta vacunal per manca de actuació solidària que ens pot perjudicar a tots..

Per tal que tingueu un document-guia, us adjuntem doc "AUJESZKY. PAUTA VACUNACIO – SEROLOGIA febrer 2010.pdf" on trobareu les pautes actuals a aplicar i les derogades per aquesta nova instrucció que te caràcter retroactiu.

Per qualsevol dubte o aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte amb el Responsable de Malalties del Porcí Sr. Ramon Balagueró o amb el GSP.

Cal que tots en felicitem per haver assolit aquest nivell de control de les Malalties del porcí, però es una fita que no ens podem permetre desapropiar per tant no podem permetre'ns cap mena de relaxació ja que hi ha malaltia en el nostre entorn de treball i la pèrdua de nivell en la pressió de vacunació i l'india de bioseguretat ens pot resultar molt perjudicial.

22 de febrer de 2010



PAUTA VACUNACIÓ AUJESZKY (febrer 2010)

ENGREIXOS TD-TF

1 ^a Vac oliosa	10-12 setm de vida (coincidint amb la setmana d'entrada a engreix)
2 ^a Vac oliosa	als 21-28 dies despres de la 1 ^a vac
3 ^a Vac oli/aigua	als 65 Kg P.V.
4 ^a Vac oli/aigua	als 6 m vida

ENGREIXOS EE i CT

1 ^a Vac oliosa	10-12 setm de vida (coincidint amb la setmana d'entrada a engreix)
2 ^a Vac oliosa	als 21-28 dies despres de la 1 ^a vac
3 ^a Vac oli/aigua	als 21-28 dies despres de la 2 ^a vac
4 ^a Vac oli/aigua	als 6 m vida

REPRODUCTORES

Mínim 3 Vac olioses/any, de forma simultània i a intervals regulars
Als municipis pendents de Qualificació (Juneda, Puig-Gros, Arbeca i Vilasana): 4 Vac olioses/any

RECRÍA

3 Vac olioses: 10-12 setm vida, 13-16 setm vida, 21-24 setm vida

Es convenient no baixar la protecció vacunal. Si es dona una situació de baixa protecció i entra el virus amb alguna partida es pot produir una reinfecció de conseqüències imprevisibles.

AUJESZKY: pautes vacunació i serologia. (24-09-09)

VACUNACIONS EN ZN

Engreix TD-TF	1ª oliosa	2ª oliosa	3ª oli/aigua	4ª
	10-12 set vida	als 21-28d	als 6m vida	
Engreix EE i CT	1ª oliosa	2ª oliosa	oli/aigua	
	10-12 set vida	als 21-28d	als 21-28d	als 6m vida
Reproductores	3 olioses/any, de forma simultània i a intervals regulars			
Recría	3 olioses: 10-12 setm, 13-16 setm, 21-24 setm vida			

VACUNACIONS EN ZR 1 i 2

Engreix TD-TF	1ª oliosa	revac oliosa	Nota: El document B de 2009, pag 5, dona la pauta de 2 olioses i la 3ª als 21 dies de la 2ª.
	10-12 set vida	cada mes	
Engreix EE i CT	1ª oliosa	revac oliosa	
	10-12 set vida	cada mes	
Reproductores	4 olioses/any, de forma simultània i a intervals regulars		
Recría	3 olioses: 10-12 setm, 13-16 set, 21-24 setm vida		

SEROLOGIA EN ZN

Reproductores	Mínim 2 controls/any (semestrals, amb interval < 7 mesos). Expl Grup Esperant quadrimestrals. Rc amb EE: 95/5 cada 2 m
Reposició	Autoreposició: 100% de cada lot que entri. Rep externa: 20% de cada lot on entri amb doc de trasllat (i certificat d'autocontrols en els 15 d previs). Si hi ha resultats desfavorables o no porta autocontrol s'ha de sagnar 100%
Engreix	TD/TF: 16 mostres 15 dies abans d'anar a escorxador. Adicionalment , si els garrins provenen de ZR 1 s'ha de fer un 1er control de 16 mostres (ADS/GSP) al mes del PEG i 16 mostres als 2, 3, 5 mesos (Vet Resp supervisat ADS/GSP). EE i Eng continu: 16 mostres per nau amb permanència > 14 setm (Vet Resp supervisat ADS/GSP). Controls quadrimestrals. Engr dels CT amb els sanejaments semestrals d'ADS/GSP
Deslletaments	TD/TF: 16 mostres per nau amb garrins > 18 Kg. Controls semestrals. EE i Eng continus: 16 mostres per nau amb garrins > 18 Kg. Controls bimensuals

SEROLOGIA ENGREIXOS ZR 1 i 2

ZR 1	TD/TF: 16 mostres als 2,5 i als 3,5 mesos del PEG (ADS/GSP). Adicionalment , si els garrins provenen de ZR 1 s'ha de fer un 1er control de 16 mostres (ADS/GSP) al mes del PEG. EE: Quadrimestralment 16 mostres de cada nau on hi hagi porcs amb permanència > 14 setm (ADS/GSP/DAR). Engreixos dels CT es faran amb els sanejaments semestrals (ADS/GSP)
ZR 2	TD/TF: 16 mostres als porcs amb permanència > 14 setm (Vet Resp, supervisat ADS/GSP). Adicionalment , si els garrins provenen de ZR 1 s'ha de fer un 1er control de 16 mostres (ADS/GSP) al mes del PEG i 16 mostres als 2,5 i 3,5 mesos (Vet Resp supervisat ADS/GSP). EE i Engr dels CT: Idem ZR 1

ZR 1: Arbeca, Puiggròs, Juneda i Vilasana.

ZR 2: Expl No de Vilasana però que estan al radi de 3 Km de la 921BC

