



# PROGRAMA DE PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA SANITÀRIA DEL PORCÍ

## - **VACUNACIONS** PERIÒDIQUES I OBLIGATÒRIES -

Les **vacunacions periòdiques** en el marc del pla de vigilància del porcí que s'han de realitzar **obligatòriament** a les explotacions porcines catalanes **a partir de gener del 2013** dependrà del tipus d'animal i de la ubicació i la qualificació sanitària de l'explotació segons es detalla en aquest document.

Les explotacions porcines catalanes qualificades com a Oficialment indemne de la Malaltia d'Aujeszky (A4) o en procés d'obtenció d'aquesta qualificació (A4b) tenen **prohibida la vacunació** dels animals enfront d'aquesta malaltia.

Les vacunes s'aplicaran pel **responsable sanitari de la prevenció i vigilància sanitària del porcí** de l'explotació o sota la seva supervisió i un cop vacunats els animals haurà d'anotar al registre corresponent les següents dades com a mínim:

- vacuna utilitzada (inclòs el seu nom comercial i el número de lot)
- data de la vacunació
- animals vacunats: identificació, número i edat

Les **vacunes a utilitzar** hauran de complir els requisits establerts a l'annex I del Reial decret 360/2009, de 23 de març, pel que s'estableixen les bases del programa coordinat de lluita, control i eradicació de la Malaltia d'Aujeszky.

### **A) REPRODUCTORS**

Vacunació obligatòria de tots els reproductors 3 cops l'any com a mínim, de forma simultània i a interval·ls regulars (aproximadament cada 4 mesos).

**Cal utilitzar obligatòriament vacunes amb excipient oliós.**

### **B) FUTURS REPRODUCTORS**

Els animals de cria s'han de vacunar com a mínim 3 cops abans d'entrar al cicle productiu:

- Primera dosi entre les **10 i 12** setmanes de vida
- Segona dosi **3-4 setmanes** després de la primera
- Tercera dosi entre les **21 i 24** setmanes de vida

**Cal utilitzar obligatòriament vacunes amb excipient oliós.**



**C) ANIMALS D'ENGREIX** (d'explotacions d'engreix TD/TF, engreixos esglaonats i engreixos de cicles tancats)

Han de realitzar **2 o 3 vacunacions** de forma obligatòria segons un dels següents protocols:

- **3 vacunacions** amb excipient **aquós**. S'aplicarà la primera vacunació entre les 10 i les 12 setmanes de vida, la segona entre 3 i 4 setmanes després de la primera i la tercera entre 3 i 4 setmanes després de la segona.
- **2 vacunacions** amb excipient **oliós**. S'aplicarà la primera vacunació entre les 10 i les 12 setmanes de vida i la segona entre 3 i 4 setmanes després.

**NOTA 1:** en tots els casos s'efectuarà una **nova vacunació als 6 mesos d'edat** i seran revacunats cada 4 mesos fins que surtin de l'explotació.

**NOTA 2:** els animals d'engreix presents a les transicions de garrins amb capacitat d'engreix, hauran de seguir el programa vacunal descrit en aquest apartat.

**D) ANIMALS PROCEDENTS D'EXPLORACIONS OFICIALMENT INDEMNES D'AUJESZKY AMB ENTRADA A EXPLORACIONS INDEMNES D'AUJESZKY:**

Els animals procedents d'una explotació qualificada com a oficialment indemne d'Aujeszky (A4) o en procés d'obtenció d'aquesta qualificació (A4b) que entrin a explotacions qualificades com a indemnes d'Aujeszky (A3), hauran de vacunar-se en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de la seva entrada a l'explotació i revacunar-se al mes, per després continuar amb les pautes de vacunació de l'explotació.

Estaran inclosos dins d'aquest supòsit els garrins procedents d'explotacions qualificades com A4 o A4b que es destinin a **transicions de garrins** qualificades A3. Es vacunaran dins dels 7 dies naturals des de la data d'entrada a l'explotació de transició i es tornaran a vacunar a l'explotació d'engreix, coincidint amb la pauta vacunal dels animals d'engreix (veure apartat C)

Barcelona, 15 de febrer de 2013

Servei de Prevenció en Salut Animal